



**MEHR
ERFAHREN**

NEUES ABITUR

ABITUR-TRAINING

Mathematik

Analysis



Mit 39 Lernvideos zur Veranschaulichung
der Musteraufgaben

STARK

Inhalt

Vorwort

Funktionen und ihre Eigenschaften	1
1 Definitionsmenge, Graph, Nullstellen, Symmetrie	2
2 Lineare Funktionen	4
3 Potenzfunktionen	9
4 Ganzrationale Funktionen	12
* 5 Gebrochenrationale Funktionen	17
6 Verschiebungen und Streckungen von Graphen	22
7 Exponentialfunktionen	26
8 Trigonometrische Funktionen	33
9 Zusammengesetzte Funktionen; Verkettung	39
 Differenzialrechnung	 41
1 Bedeutung der Ableitung	42
2 Ableitungsregeln	45
3 Untersuchung von Funktionen und Graphen	49
4 Tangente und Normale	58
5 Schnitt von Graphen, Berührung, Orthogonalität	62
* 6 Ortslinien	64
7 Änderungsraten	66
 Integralrechnung	 71
1 Bedeutung des Integrals	72
2 Bestimmung von Stammfunktionen – Technik des Integrierens	73
3 Berechnung von Flächeninhalten	78
* 4 Rotationskörper	89
* 5 Die Integralfunktion	90
6 Rekonstruktion eines Bestandes aus der momentanen Änderungsrate	93

Vermischte Aufgaben	99
A Innermathematische Fragestellungen	100
B Anwendungsbezogene Fragestellungen	112
Lösungen	127
Stichwortverzeichnis	261

Autoren:

Dr. Raimund Ordowski, Arnold Zitterbart



Bei **MySTARK** finden Sie **Lernvideos** zu allen Musteraufgaben.
Den Zugangscode zu MySTARK finden Sie vorne im Buch.

Vorwort

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

mit dem vorliegenden Trainingsband für die **Analysis** halten Sie ein Buch in Händen, das Sie bei der Vorbereitung auf Klausuren und auf die schriftliche Abiturprüfung im Fach Mathematik umfassend unterstützt.

Das Buch ist sowohl für das **grundlegende** als auch für das **erhöhte Anforderungsniveau** (also **GK** und **LK**) geeignet. Lernabschnitte, die nur für das erhöhte Anforderungsniveau relevant sind, wurden mit einem * markiert. Die Einteilung erfolgte hierbei nach den **Vorgaben der Bildungsstandards** und kann in den einzelnen Bundesländern leicht davon abweichen.

Aufgrund des modularen Aufbaus müssen Sie das Buch nicht von vorne nach hinten lesen. Beginnen Sie Ihr Training in dem Stoffgebiet, in dem Sie Probleme haben. Folgende Elemente erleichtern dabei das Lernen und Verstehen:

- **Definitionen** und **Regeln** werden klar und präzise formuliert und in blauen Kästen hervorgehoben, damit Sie die zentralen Inhalte eines Abschnitts schnell erfassen können.
- **Beispiele** verdeutlichen die Themen und helfen Ihnen, die Theorie praktisch nachzuvollziehen. 
- **Musteraufgaben** zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Rechen- und Denkwege nachvollziehen und anwenden können. 
- **Lernvideos** ergänzen die Musteraufgaben: Auf MySTARK finden Sie alle Videos, die Ihnen das jeweilige Thema anschaulich erläutern. 
- **Übungsaufgaben** ermöglichen Ihnen, den gelernten Stoff anzuwenden und Ihre Fähigkeiten zu überprüfen. 

Darunter gibt es Übungsaufgaben, die **ohne Hilfsmittel** gelöst werden können. 

- **Lösungen** zu allen Übungsaufgaben finden Sie am Ende des Buches. Sie sind ausführlich erklärt, damit Sie jeden Schritt und den Lösungsansatz genau nachvollziehen können.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für die gesamte Abiturprüfung und alles erdenklich Gute für Ihren weiteren Lebensweg.

Ihr Autorenteam und Ihr STARK Verlag

1 Bedeutung der Ableitung

Unter bestimmten Bedingungen kann man eine Funktion f **ableiten** oder **differenzieren** und erhält die zugehörige **Ableitungsfunktion** oder kurz **Ableitung f'** .

Die folgende Darstellung soll verschiedene Bedeutungen der Ableitung erläutern, ohne auf ausführliche und exakte Herleitungen des Unterrichts einzugehen.

Für die Funktion f mit $f(x) = x^2$ erhält man die Ableitungsfunktion f' mit $f'(x) = 2x$ (vgl. Abschnitt 2 ab Seite 45).

Die **Ableitung $f'(x_0)$ an einer Stelle x_0** kann man auf zwei Arten interpretieren:

(1) Steigung des Graphen im Punkt $P_0(x_0 | f(x_0))$


Dabei versteht man unter der Steigung des Graphen G_f in P_0 die Steigung der Geraden, die sich in diesem Punkt „optimal“ an den Graphen „anschmiegt“, d. h., ihn in P_0 „berührt“. Man nennt sie **Tangente t** an den Graphen im Punkt P_0 .

Für die vorgegebene Funktion f gilt:

Der Funktionswert an der Stelle $x_0 = 1$ ist $f(1) = 1$.

Die Ableitung an der Stelle $x_0 = 1$ hat den Wert $f'(1) = 2$.

Daher hat die Tangente t im Punkt $P_0(1 | 1)$ die Steigung $m = f'(1) = 2$.




(2) Momentane oder lokale Änderungsrate an der Stelle x_0

Die vorgegebene Funktion f kann beispielsweise den zurückgelegten Weg eines Fahrzeugs in Abhängigkeit von der Zeit beschreiben, wobei $f(x)$ in Meter und x in Sekunden gemessen wird.

Dann bedeutet:

$f(1) = 1$: Das Fahrzeug hat in einer Sekunde ab dem Start einen **Weg** der Länge 1 Meter zurückgelegt.

$f'(1) = 2$: Das Fahrzeug hat nach einer Sekunde eine **Geschwindigkeit** von 2 Meter pro Sekunde, d. h., die **momentane Änderungsrate** des Weges beträgt 2 Meter pro Sekunde.




Die nachfolgende Übersicht zeigt Beispiele für momentane Änderungsraten.

Die Funktion f stellt dar:	Die Ableitung f' bedeutet:
zurückgelegte Wegstrecke in Meter (m) in Abhängigkeit von der Zeit in Sekunden (s)	Geschwindigkeit in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$
Geschwindigkeit in $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ in Abhängigkeit von der Zeit in Sekunden (s)	Beschleunigung in $\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
Wassermenge in m^3 in einem Becken in Abhängigkeit von der Zeit in min	Zuflussrate oder Abflussrate in $\frac{\text{m}^3}{\text{min}}$
Kraftstoffinhalt eines Autotanks in Liter in Abhängigkeit vom zurückgelegten Weg in km	Kraftstoffverbrauch in $\frac{\text{Liter}}{\text{km}}$
Bestand einer Population in Abhängigkeit von der Zeit in Jahren (a)	Zuwachsrates in $\frac{1}{\text{a}}$



Musteraufgabe

Die Abbildung zeigt den Graphen G_f einer Funktion f . Zeichnen Sie möglichst genau die Tangenten an G_f bei den Stellen $x_1=1$ und $x_2=3$ in die Abbildung ein und bestimmen Sie grafisch $f'(1)$ und $f'(3)$. Der Graph $G_{f'}$ der Ableitungsfunktion f' ist eine Gerade. Zeichnen Sie $G_{f'}$ in die Abbildung ein.



Lösung Die beiden Tangenten zeichnet man mit dem Geodreieck nach Augenmaß in die Abbildung ein.




Video 16

Die Tangente an der Stelle $x_1=1$ verläuft waagrecht. Ihre Steigung ist daher $m_1=0$, es gilt also $f'(1)=0$.

An einem geeigneten Steigungsdreieck liest man für die Tangente an der Stelle $x_2=3$ die Steigung $m_2=-1,5$ ab. Somit gilt $f'(3)=-1,5$.

Der Graph $G_{f'}$ der Ableitung f' ist die Gerade, die durch die Punkte $P_1(1|0)$ und $P_2(3|-1,5)$ verläuft.




Beispiele und Aufgaben zu Änderungsraten finden Sie in Abschnitt 7 (ab Seite 66) sowie in Abschnitt 6 im Kapitel „Integralrechnung“ ab Seite 93.




Übungsaufgaben

- 41 Die Abbildung zeigt den Graphen einer Funktion f . Bestimmen Sie grafisch wie in der Musteraufgabe näherungsweise $f'(-1)$ und $f'(1,5)$. Skizzieren Sie den Graphen von f' in die Abbildung.



- 42 Der abgebildete Graph einer Funktion f ist symmetrisch zur y -Achse. Im Bereich $0 \leq x \leq 2$ ist $f'(1) = 2$ der größte Wert der Ableitungsfunktion f' . Skizzieren Sie den Graphen der Ableitungsfunktion f' in die Abbildung.



Also gilt für $x_1 = 0$: $(u \circ v)(0) = u(v(0)) = u(-1) = 0$

und für $x_2 = 2$: $(u \circ v)(2) = u(v(2)) = u(3) = 0$

- 40 Für die Verkettung $f \circ g$ mit $f(x) = \frac{1}{x-1}$ und $g(x) = x^2 - 3$ erhält man:

$$f(g(x)) = \frac{1}{g(x)-1} = \frac{1}{(x^2-3)-1} = \frac{1}{x^2-4}$$

Die Definitionslücken dieser gebrochenrationalen Funktion erhält man, indem man das Nennerpolynom gleich 0 setzt:

$$x^2 - 4 = 0$$


$$x^2 = 4$$

$$x_{1,2} = \pm 2$$

Für $x_1 = -2$ und $x_2 = 2$ ist die Verkettung nicht definiert.


- 41 An den Graphen G_f zeichnet man mit dem Geodreieck möglichst genau die Tangenten an den Stellen $x_1 = -1$ und $x_2 = 1,5$. Mithilfe von Steigungsdreiecken bestimmt man ihre Steigungen, die gleich den Ableitungen an diesen Stellen sind. Man erhält: $f'(-1) \approx 1,4$ und $f'(1,5) \approx -2,6$

Diese beiden Werte geben auch ungefähr die größte bzw. kleinste Steigung des Graphen zwischen den Tiefpunkten an. Berücksichtigt man noch, dass am Hochpunkt bzw. an den Tiefpunkten von G_f die Tangenten waagrecht verlaufen, d. h., dass f' an den entsprechenden x -Werten den Funktionswert 0 hat, kann man mit diesen Informationen den Graphen $G_{f'}$ der Ableitung skizzieren.



- 42** Aus $f'(1)=2$ folgt wegen der Achsensymmetrie von G_f zur y -Achse $f'(-1)=-2$ als kleinste Steigung im Bereich $-2 \leq x \leq 0$.

Berücksichtigt man noch, dass am Tiefpunkt bzw. an den Hochpunkten von G_f die Tangenten waagrecht verlaufen, d. h., dass f' an den entsprechenden x -Werten den Funktionswert 0 hat, kann man mit diesen Informationen den Graphen $G_{f'}$ der Ableitung skizzieren.



- 43** Für die folgenden Ableitungen brauchen Sie neben der Summen- und der Faktorregel vor allem die Produkt- und die Kettenregel.

a) $f(x) = x^4 \cdot e^{3x+1}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= 4x^3 \cdot e^{3x+1} + x^4 \cdot e^{3x+1} \cdot 3 = 4x^3 \cdot e^{3x+1} + 3x^4 \cdot e^{3x+1} \\ &= (4x^3 + 3x^4) \cdot e^{3x+1} \end{aligned}$$

b) $f(x) = (2x^2 + x) \cdot e^{-4x}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= (4x+1) \cdot e^{-4x} + (2x^2+x) \cdot e^{-4x} \cdot (-4) \\ &= (4x+1) \cdot e^{-4x} + (-8x^2-4x) \cdot e^{-4x} \\ &= (1-8x^2) \cdot e^{-4x} \end{aligned}$$

c) $f(x) = \sqrt{x} \cdot e^{-3x}$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot e^{-3x} + \sqrt{x} \cdot e^{-3x} \cdot (-3) = \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} - 3\sqrt{x} \right) \cdot e^{-3x}$$

d) $f(x) = (2+e^{2x})^3$

$$f'(x) = 3 \cdot (2+e^{2x})^2 \cdot e^{2x} \cdot 2 = 6 \cdot (2+e^{2x})^2 \cdot e^{2x}$$

e) $f(x) = \frac{1}{x^3} \cdot e^{-5x+2} = x^{-3} \cdot e^{-5x+2}$

$$\begin{aligned} f'(x) &= -3 \cdot x^{-4} \cdot e^{-5x+2} + x^{-3} \cdot e^{-5x+2} \cdot (-5) = -\frac{3}{x^4} \cdot e^{-5x+2} - \frac{5}{x^3} \cdot e^{-5x+2} \\ &= -\left(\frac{3}{x^4} + \frac{5}{x^3} \right) \cdot e^{-5x+2} \end{aligned}$$

f) $f(x) = x^2 \cdot \sqrt{3x+2}$

$$f'(x) = 2x \cdot \sqrt{3x+2} + x^2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{3x+2}} \cdot 3 = 2x \cdot \sqrt{3x+2} + \frac{3x^2}{2\sqrt{3x+2}}$$



© **STARK Verlag**

www.stark-verlag.de
info@stark-verlag.de

Der Datenbestand der STARK Verlag GmbH
ist urheberrechtlich international geschützt.
Kein Teil dieser Daten darf ohne Zustimmung
des Rechteinhabers in irgendeiner Form
verwertet werden.

STARK