

Aufgaben

- 1** Der Biohof Braun baut Biolandgemüse zum Verkauf in seinem Hofladen an. Der Einsatz der beiden Produktionsfaktoren Dünger(x) und Arbeit (y) kann für einen Output von 250 Mengeneinheiten [ME] durch folgenden funktionalen Zusammenhang angenähert werden: $l(x) = \frac{4}{x-4} + 1$.
- a) Ermitteln Sie den ökonomisch sinnvollen Definitionsbereich für x.
- b) Der Preis für eine ME des Produktionsfaktors x beträgt 5 Geldeinheiten [GE]. Eine ME des Produktionsfaktors y kostet 2 GE. Bestimmen Sie die Isokostengerade. Geben Sie die Werte von K an, für die realisierbare Produktionsmöglichkeiten entstehen und die Werte, für die keine Produktionsmöglichkeiten realisierbar sind. Stellen Sie den gesamten Sachverhalt grafisch dar. Berechnen Sie die Minimalkostenkombination und die Kosten der Minimalkostenkombination. Interpretieren Sie die ökonomische Bedeutung der Minimalkostenkombination.

- 2** Das Pharmaunternehmen Medipharm AG baut zur Herstellung eines homöopathischen Medikaments die Pflanze Arnika an.

- a) Der Einsatz der beiden Produktionsfaktoren Dünger (x) und Arbeit (y) kann durch folgenden funktionalen Zusammenhang angenähert werden: $l(x) = y = a + \frac{b}{x+c}$; $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a, b > 0$, $c \neq 0$. Der Output von 500 (ME) wird durch die folgenden Faktormengenkombinationen erzielt:



x Dünger in ME	4	6	10
y Arbeit in ME	4	3	2,5

Weisen Sie nach, dass für die Isoquantenfunktion l_{500} gilt: $l_{500}(x) = 2 + \frac{4}{x-2}$.

- b) Der Preis für eine ME des Produktionsfaktors Dünger beträgt 4 GE, eine ME des Produktionsfaktors Arbeit kostet 2 GE. Bestimmen Sie die Vorschrift der Isokostenfunktion l_K , wenn genau K GE zur Verfügung stehen. Berechnen Sie die Faktormengenkombinationen, die bei Einsatz von K = 40 GE möglich sind. Bestimmen Sie die Minimalkostenkombination. Berechnen Sie die dabei entstehenden Kosten K^* .
- c) Bei gleicher Isoquantenfunktion, aber veränderten Faktorpreisen für p_x und p_y soll die Minimalkostenkombination im Punkt M(6 | 3) liegen. Bestimmen Sie für diese Situation das Preisverhältnis $p_x : p_y$ der beiden Produktionsfaktoren. Berechnen Sie zu beliebigem p_x die minimalen Kosten.
- d) Für eine weitere Isoquantenfunktion l_{p^*} ist die Funktion der Grenzrate der Substitution mit $l_{p^*}'(x) = \frac{-8}{(x-2)^3}$ gegeben. Die Grenzrate der Substitution gibt Auskunft über die notwendige Substitution der beiden Produktionsfaktoren und wird durch die 1. Ableitung der Isoquantenfunktion definiert. Berechnen und interpretieren Sie diese an der Stelle $x = 4$.

Test zur Überprüfung Ihrer Grundkenntnisse

1 Skizzieren Sie den Graphen der Funktion f . Bestimmen Sie D_{\max} und die Asymptoten.

a) $f(x) = 4 + \frac{1}{x}$

b) $f(x) = \frac{1}{x-5}$

c) $f(x) = \frac{2-4x}{x}$

2 Einer der drei Funktionsterme

$$f(x) = 3 + \frac{1}{x-2}$$


$$g(x) = 3 + \frac{2}{x-2}$$

$$h(x) = 3 + \frac{4}{x-1}$$

beschreibt den Graphen in der Abbildung.

Bestimmen Sie den Funktionsterm.

Begründen Sie Ihre Antwort.



3 Die Schoki AG verwendet zur Schokoladenherstellung Milch und Milchpulver. Für die Produktion von 200 ME gilt die Isoquante $l_{200}(x) = \frac{12}{x-1} + 3$. Das Milchpulver kostet 3 GE/ME, die Milch 4 GE/ME.

a) Insgesamt sind für den Einkauf von Milchpulver und Milch 48 GE eingeplant. Zeigen Sie, dass die Gleichung der Isokostengeraden dann $I_{K48}(x) = -\frac{3}{4}x + 12$ lautet.

b) Bestimmen Sie die Gleichung der kostenminimalen Isokostengeraden. Berechnen Sie die zugehörigen minimalen Kosten.

4 Die Gesamtkosten der Produktion eines Unternehmens werden durch die Kostenfunktion K mit $K(x) = \frac{1}{6}x^3 - 2x^2 + 14x + 12$; $0 \leq x \leq 15$ beschrieben.


Die Funktion der Stückkosten wird mit k , die der variablen Stückkosten mit k_v bezeichnet.

a) Die Abbildung zeigt die Schaubilder von k und k_v . Ordnen Sie zu. Begründen Sie Ihre Zuordnung.

b) Bestimmen Sie die Funktionsterme $k(x)$ und $k_v(x)$.

c) Zeigen Sie: Die minimalen Stückkosten werden für $x > 6$ (ME) angenommen.

Begründen Sie Ihre Antwort.



5 Die Firma Stuckenberg stellt Messgeräte für die Medizin her. Gegeben sind eine Nachfragefunktion $p_N(x) = 200 - 5x^2$ und die Angebotsfunktion $p_A(x) = 20x + 50$.

a) Bestimmen Sie die Gleichgewichtsmenge und den Gleichgewichtspreis.

b) Ermitteln Sie die Preiselastizitätsfunktion der Nachfrage $e_N(x)$ in Abhängigkeit von der Menge x und stellen Sie die Funktion grafisch dar.

c) Berechnen Sie die Mengen, für die das Angebot fließend bzw. elastisch ist.

d) Bestimmen Sie die Elastizität von Angebot und Nachfrage im Marktgleichgewicht. Interpretieren Sie diese Werte.

2.5 Wirtschaftliche Anwendungen der Integralrechnung

Konsumenten- und Produzentenrente

Die **Konsumentenrente** ist die Summe der Ersparnisse der Konsumenten, der Gesamtnutzen aller Nachfrager. Die **Produzentenrente** ist der Umsatzvorteil (Erlösvorteil) der Produzenten aus dem Gleichgewichtspreis und den niedrigeren Angebotspreisen.

Beispiel 1

- Angebot und Nachfrage nach Handys mit Navigationssystem werden durch die Angebotsfunktion p_A und die Nachfragefunktion p_N mit $p_N(x) = 160 - 0,5x^2$ und $p_A(x) = x^2 + 10$ mit $0 \leq x \leq 15$ beschrieben. Dabei gibt x die angebotene bzw. nachgefragte Menge in ME und $p_A(x)$ bzw. $p_N(x)$ den jeweiligen Preis in GE/ME an. Berechnen Sie das Marktgleichgewicht, die Produzentenrente und die Konsumentenrente.

Lösung

Marktgleichgewicht: $p_A(x) = p_N(x)$

$$160 - 0,5x^2 = x^2 + 10$$

$$1,5x^2 = 150$$

$$x_1 = 10 \quad (x_2 = -10 < 0)$$

nur eine positive Lösung

Gleichgewichtspreis: $p_N(10) = 110$

Marktgleichgewicht MG (10 | 110)


Produzentenrente:

$$PR = \int_0^{10} (110 - p_A(x)) dx \approx 666,67$$

Konsumentenrente:

$$KR = \int_0^{10} (p_N(x) - 110) dx \approx 333,33$$

Die Produzentenrente beträgt ca. 667 GE und die Konsumentenrente beträgt ca. 333 GE.



Beachten Sie

$$\text{Konsumentenrente: } KR = \int_0^{x_G} (p_N(x) - p_G) dx = \int_0^{x_G} p_N(x) dx - x_G \cdot p_G$$

Inhalt der **Fläche** zwischen dem Graph der Nachfragefunktion und der Preislinie.

$$\text{Produzentenrente: } PR = \int_0^{x_G} (p_G - p_A(x)) dx = x_G \cdot p_G - \int_0^{x_G} p_A(x) dx$$

Inhalt der **Fläche** zwischen dem Graphen der Angebotsfunktion und der Preislinie.

Die Funktionen p_A und p_N sind für $x \geq 0$ definiert.

Beispiel 2

- ➔ Angebot und Nachfrage nach Handys mit Navigationssystem werden durch die Angebotsfunktion p_A und die Nachfragefunktion p_N mit $p_A(x) = e^{0,5x-3}$ und $p_N(x) = e^{-0,2x+4}$ mit $x \in \mathbb{R}$ und $0 \leq x \leq 15$ beschrieben. Dabei gibt x die angebotene bzw. nachgefragte Menge in ME und p_A bzw. p_N den jeweiligen Preis in GE/ME an.
- Berechnen Sie das Marktgleichgewicht und die Konsumentenrente.
- Vergleichen Sie die Produzentenrente mit dem Umsatz.

Lösung

Marktgleichgewicht: $p_A(x) = p_N(x)$

$$e^{0,5x-3} = e^{-0,2x+4}$$

Vergleich der Hochzahlen:

$$0,5x - 3 = -0,2x + 4 \text{ ergibt } x = 10$$

Gleichgewichtspreis: $p_N(10) = e^2$

Marktgleichgewicht MG (10 | e^2)


Konsumentenrente:

$$KR = \int_0^{10} p_N(x) dx - 10 \cdot e^2 \approx 162,15$$

Die Konsumentenrente beträgt 162,15 GE.

Produzentenrente: $PR = 10 \cdot e^2 - \int_0^{10} p_A(x) dx \approx 59,21$

Der Umsatz beträgt $10 \cdot e^2 \approx 73,89$, die Produzentenrente beträgt 59,21 GE und macht etwa 80 % des Umsatzes aus.



Aufgaben


- Die Nachfrage nach einem bestimmten Produkt ergibt sich aus der Nachfragefunktion p_N mit $p_N(x) = 10 - 0,04x^2$. Die Angebotsfunktion p_A ist gegeben durch $p_A(x) = 0,75x + 2$. Stellen Sie das Marktgleichgewicht, die Produzenten- und die Konsumentenrente grafisch dar.
Bestimmen Sie die Konsumenten- und die Produzentenrente und interpretieren Sie Ihr Ergebnis aus ökonomischer Sicht.
- Ein Unternehmen verkauft 120 ME seiner Ware zu einem Stückpreis von 90 GE. Die Marktforschung hat ermittelt, dass bei einer Erhöhung des Stückpreises um 10 GE die Nachfrage um 20 ME sinkt. Für die Angebotsfunktion p_A gilt: $p_A(x) = 0,02x^2 + 35$
 - Bestimmen Sie die Nachfragefunktion p_N .
 - Auf dem Markt stellt sich durch Gegenüberstellung ein Gleichgewichtspreis ein. Bestimmen Sie das Marktgleichgewicht rechnerisch und grafisch.
 - Berechnen Sie den Preis, den der Anbieter bei einer verkauften Menge von 50 ME erzielen kann.
 - Ermitteln Sie die Konsumenten- und die Produzentenrente.

- 3** Für den Hersteller von Biomilch lässt sich der Markt wie folgt beschreiben:

$$p_A(x) = 1 - \frac{3}{x-3} \quad \text{und} \quad p_N(x) = -x^3 + 4,5x^2 - 7,1x + 10,6.$$

Ermitteln Sie den ökonomisch sinnvollen Definitionsbereich für die gesamte Marktsituation und begründen Sie die Grenzen des Definitionsbereichs. Erläutern Sie die daraus resultierende Auswirkung für den Hersteller. Skizzieren Sie die Graphen der Angebots- und der Nachfragefunktion in ein geeignetes Koordinatensystem und kennzeichnen Sie die Konsumenten- und Produzentenrente. Ermitteln Sie das aktuelle Marktgleichgewicht. Der Hersteller behauptet, dass die Produzentenrente mindestens 50% des Umsatzes ausmacht. Untersuchen Sie, ob die Aussage richtig ist.

- 4** Die Abbildung zeigt die Nachfragekurve der Funktion p_N mit $p_N(x) = 0,1x^2 - 8x + 150$ für $x \geq 0$ und den Graphen der Angebotsfunktion.



- Bestimmen Sie das Marktgleichgewicht.
- Erläutern Sie den Sachverhalt, der durch die Strecke AB dargestellt wird.
- Berechnen Sie die Konsumenten- und die Produzentenrente.

- 5** Auf dem Markt für Pumpen lässt sich die Nachfrage beschreiben durch

$$p_N(x) = 16 - 0,25x^2 \quad \text{und} \quad \text{das Angebot durch} \quad p_A(x) = \frac{1}{100}x^3 + 5; \quad x \geq 0.$$

Stellen Sie die Situation grafisch dar.

Berechnen Sie die Gleichgewichtsmenge und den Gleichgewichtspreis.

Bestimmen Sie die Konsumenten- und die Produzentenrente.

- 6** Der Hersteller einer bekannten Modemarke rechnet für ein Produkt mit der Nachfragefunktion p_N mit $p_N(x) = (x + 1)e^{1-3x}$ und der Angebotsfunktion p_A mit $p_A(x) = 0,1e^{1,2x}$. Mengeneinheiten x werden in 10000 Stück, Preise in GE je ME angegeben.

Der Hersteller kann maximal 14000 Stück produzieren.

Bestimmen Sie das maximale Intervall des Anbieterpreises und das Marktgleichgewicht.

Berechnen Sie die Konsumenten- und die Produzentenrente. Skizzieren Sie diesen

Sachverhalt in einem geeigneten Koordinatensystem.

- 7** Der Naturkosmetikproduzent rechnet für sein neu eingeführtes Produktset als Angebotsmonopolist mit der Nachfragefunktion p_N mit $p_N(x) = 16(x + 1)e^{1-x}$.

Die Angebotsfunktion p_A ist gegeben durch $p_A(x) = x^2$.

Zeigen Sie, dass die Funktion P_N mit $P_N(x) = -16(x + 2)e^{1-x}$ eine Stammfunktion von p_N ist.

Bestimmen Sie die Konsumentenrente und die Produzentenrente.

Erläutern Sie die ökonomische Bedeutung Ihres Ergebnisses.

Von der Änderungsrate zum Bestand

Beispiel 1

➔ Der Hersteller JUKO hat beschlossen, seine Produktion zu erweitern. Dafür muss er Investitionen vornehmen, die die Gesamtkosten verändern. Die Gesamtkosten werden durch die Funktion K mit $K(x) = 0,5x^2 + 20$ angenähert.

Dabei wird x in ME und $K(x)$ in GE angegeben.

Bestimmen Sie das Integral $\int_1^4 K'(x)dx$ und interpretieren Sie das Ergebnis aus mathematischer und aus ökonomischer Sicht.

Lösung

Berechnung des Integrals: $\int_1^4 K'(x)dx = [K(x)]_1^4 = K(4) - K(1) = 28 - 20,5 = 7,5$

Das Integral berechnet den Inhalt der Fläche zwischen der x -Achse und dem Graphen der Grenzkostenfunktion in dem Intervall $[1; 4]$.

Der Inhalt der Fläche beträgt 7,5. Aus ökonomischer Sicht gibt dieser Wert die **Erhöhung der Gesamtkosten** an, wenn sich die Produktionsmenge von 1 ME auf 4 ME erhöht.

Beispiel 2

➔ Der Konzern EABW befürchtet aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage, dass sich die Gewinnsituation verändert. Die Gewinnfunktion G wird durch die Gleichung $G(x) = -0,5x^2 + 15x - 28$ dargestellt. Die Kapazitätsgrenze liegt bei 25 ME.

Bestimmen Sie die Gewinnschwelle x_{GS} und ermitteln Sie das Integral $\int_{x_{GS}}^{25} G'(x)dx$.

Interpretieren Sie das Ergebnis aus mathematischer und aus ökonomischer Sicht.

Lösung

Gewinnschwelle x_{GS} : $G(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2 \vee x = 28$

$x_{GS} = 2$ ist die Gewinnschwelle: $\int_2^{25} G'(x)dx = G(25) - G(2) = G(25) = 34,5$

Interpretation: Das Integral berechnet den Inhalt der Fläche zwischen der Abszissenachse und dem Graphen der Grenzgewinnfunktion in dem Intervall $[2; 25]$.

Der Inhalt der Fläche beträgt ca. 34,5.

Aus ökonomischer Sicht gibt dieser Wert den zusätzlichen Gewinn bzw. die Gewinnänderung an, wenn die Produktion von 2 ME auf 25 ME erhöht wird.

$f'(x)$ (Änderungsrate von f)	$\int_a^b f'(x)dx = f(b) - f(a)$ (Bestandsänderung)
• Grenzkosten ($K'(x)$)	Zunahme der Gesamtkosten bei einer Produktionserhöhung von a auf b
• Grenzgewinn ($G'(x)$)	Gesamtänderung des Gewinns bei einer Produktionserhöhung von a auf b
• Grenzerlös ($E'(x)$)	Gesamtänderung des Erlöses bei einer Produktionserhöhung von a auf b

Aufgaben

- 1** Der Kostenzuwachs eines Betriebes für die Produktion von x ME lässt sich beschreiben durch $K'(x) = 3x^2 - 14x + 135$, x in ME; $K'(x)$ in $\frac{\text{Geldeinheit}}{\text{Mengeinheit}}$ ($\frac{\text{GE}}{\text{ME}}$).

Berechnen Sie folgende Integrale und interpretieren Sie Ihre Ergebnisse ökonomisch.

a) $\int_0^5 K'(x) dx$ b) $\int_5^{10} K'(x) dx$ c) $20 + \int_0^{10} K'(x) dx$

- 2** Ein Unternehmen stellt Glaskugeln für Großabnehmer her. Die Gesamtkosten und der Erlös lassen sich in Abhängigkeit der produzierten ME beschreiben durch

$$K(x) = 0,1x^3 - 5x^2 + 125x + 900 \text{ und durch } E(x) = -2,5x^2 + 350x.$$

Zwischen 10 ME und 30 ME erzielt das Unternehmen keinen Verlust.


Bestimmen Sie das Integral $\int_{10}^{30} (E'(x) - K'(x)) dx$ und interpretieren Sie das Ergebnis aus mathematischer und aus ökonomischer Sicht.

- 3** Ermitteln Sie die Grenzkostenfunktion K' , wenn die Gesamtkostenfunktion K mit $K(x) = 0,4x^3 - 2,4x^2 + 5x + 16,8$; x in ME, gegeben ist.

Skizzieren Sie den Graphen der Grenzkostenfunktion K' in einem geeigneten Koordinatensystem.

Berechnen Sie den Inhalt der Fläche unter dem Graphen von K' im Intervall $[0; 3]$ und interpretieren Sie Ihr Ergebnis aus wirtschaftlicher Sicht.

- 4** Die Gerade in der Abbildung beschreibt den Grenzerlös eines Monopolisten in GE/ME auf $0 \leq x \leq 7$. Berechnen Sie den Inhalt der markierten Fläche und interpretieren Sie Ihr Ergebnis.



2.3 Erwartungswert und Varianz einer Binomialverteilung

Erwartungswert

Beispiel 1

➔ An einer Schule in Köln gibt es hitzefrei, wenn die Quecksilbersäule des Thermometers im Schatten mehr als 25 °C anzeigt. Der deutsche Wetterdienst meldet für den Zeitraum vom 20. Juni bis 22. Juni eine Wahrscheinlichkeit von 30 % für Temperaturen, die höher als 25 °C sind.

Die Zufallsvariable X beschreibt die Anzahl der hitzefreien Tage im genannten Zeitraum.

Erstellen Sie eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Zufallsvariable X .

Während des angegebenen Zeitraums kann mit etwa einem hitzefreien Tagen gerechnet werden. Überprüfen Sie diese Aussage.

Lösung

Jedes einzelne Experiment hat zwei Ausgänge (mehr als 25 °C; weniger oder gleich 25 °C) mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von $p = 0,3$.

Es liegt eine Bernoulli-Kette der Länge $n = 3$ vor. X ist eine $B_{3;0,3}$ -verteilte Zufallsvariable.

Wahrscheinlichkeitsverteilung

k	0	1	2	3
$B_{3;0,3}(k)$	$\binom{3}{0} 0,3^0 0,7^3 = 0,343$	$\binom{3}{1} 0,3^1 0,7^2 = 0,441$	$\binom{3}{2} 0,3^2 0,7^1 = 0,189$	$\binom{3}{3} 0,3^3 0,7^0 = 0,027$

Gesucht ist die Anzahl der zu erwartenden hitzefreien Tage, d. h. $E(X)$.

Berechnung des Erwartungswerts $E(X)$ mit $E(X) = \sum_{i=0}^n x_i \cdot P(X = x_i)$.

$$E(X) = \sum_{k=0}^3 k \cdot B_{3;0,3}(k) = 0 \cdot 0,343 + 1 \cdot 0,441 + 2 \cdot 0,189 + 3 \cdot 0,027 = 0,9$$

Voraussichtlich kann man während des Zeitraums mit 0,9 hitzefreien Tagen rechnen.

Plausibilitätsbetrachtung

Wenn die Wahrscheinlichkeit für jeden hitzefreien Tag $p = 0,3$ ist und man drei Tage ($n = 3$) betrachtet, so ergibt sich die Anzahl der zu erwartenden hitzefreien Tage mit

$$E(X) = 3 \cdot 0,3 = 0,9 \quad \text{Allgemein: } E(X) = n \cdot p$$

Beachten Sie

Eine $B_{n,p}$ -verteilte Zufallsvariable X hat den Erwartungswert

$$E(X) = n \cdot p$$

Für $E(X)$ schreibt man auch μ .

Beispiel 2

Binomialverteilungen für $p = 0,3$ und verschiedene n -Werte:

$$n = 10$$

$$\mu = 3$$




$$n = 50$$

$$\mu = 15$$

$$n = 100$$

$$\mu = 30$$

Der **Erwartungswert** μ ist ganzzahlig.



Mithilfe der Abbildung ergibt sich: Die **größte Wahrscheinlichkeit** liegt im Erwartungswert.

z. B. für $n = 10$ und $p = 0,3$:

$$B_{10; 0,3}(3) = 0,2668$$

zum Vergleich:

$$B_{10; 0,3}(2) = 0,2335; B_{10; 0,3}(4) = 0,2001$$

Beispiel 3

- ➔ Die Zufallsvariable X ist binomialverteilt mit $n = 30$ und $p = 0,15$.
Bestimmen Sie den Erwartungswert und die größte Wahrscheinlichkeit.


Lösung

Für den Erwartungswert gilt: $\mu = n \cdot p = 30 \cdot 0,15 = 4,5$

Dies ist kein Wert der Zufallsvariablen X ($X = x_i \in \mathbb{N}$).

Mithilfe der Abbildung:

Die größte Wahrscheinlichkeit liegt bei einem der benachbarten ganzzahligen Werte:



$$P(X = 4) = B_{30; 0,15}(4) = 0,2028; P(X = 5) = 0,1861$$

Die größte Wahrscheinlichkeit beträgt 0,2028.

Varianz und Standardabweichung

Formel für die Varianz:

$$\sigma^2 = \sum_{k=0}^n (k - E(X))^2 \cdot B_{n;p}(k)$$

Man betrachtet ein einzelnes Bernoulli-Experiment einer Bernoulli-Kette.

Wahrscheinlichkeitsverteilung

$n = 1; E(X) = p$

k	0	1
$B_{n;p}(k)$	$\binom{1}{0} p^0(1-p)^1 = 1-p$	$\binom{1}{1} p^1(1-p)^0 = p$

Varianz für ein einziges Bernoulli-Experiment

$$\sigma^2 = \sum_{k=0}^1 (k - p)^2 \cdot B_{1;p}(k) = (0 - p)^2(1 - p) + (1 - p)^2 p = p^2(1 - p) + (1 - 2p + p^2)p$$

$$\sigma^2 = p^2 - p^3 + p - 2p^2 + p^3 = p - p^2 = p(1 - p)$$

Varianz für ein Bernoulli-Experiment: $\sigma^2 = p \cdot (1 - p)$

Varianz für n Bernoulli-Experimente (ohne Beweis): $\sigma^2 = n \cdot p \cdot (1 - p)$

Beachten Sie

Eine $B_{n;p}$ -verteilte Zufallsvariable X hat die **Varianz** $\sigma^2 = n \cdot p \cdot (1 - p)$ und die **Standardabweichung** $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}$.

Beispiel 4

➔ Bei der Produktion von Zündkerzen sind erfahrungsgemäß 2 % defekt. Bei einer Kontrolle werden bei einer Stichprobe 200 Zündkerzen aus der laufenden Produktion entnommen. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl der defekten Zündkerzen im Intervall $I = [\mu - \sigma; \mu + \sigma]$ mit $\mu = E(X)$ liegt.

Lösung

Die Zufallsvariable X gibt die Anzahl der defekten Zündkerzen an. X ist $B_{200;0,02}$ -verteilt.

Zu erwartende Anzahl defekter Zündkerzen: $\mu = n \cdot p = 200 \cdot 0,02 = 4$

Varianz: $\sigma^2 = n \cdot p \cdot (1 - p) \quad \sigma^2 = 200 \cdot 0,02 \cdot 0,98 = 3,92$

Standardabweichung: $\sigma = \sqrt{\text{Varianz}} \quad \sigma = \sqrt{3,92} = 1,98$


Intervall $I = [\mu - \sigma; \mu + \sigma]: \quad I = [2,02; 5,98]$

D.h.: In diesem Intervall liegen die ganzen Zahlen 3; 4; 5.


Wahrscheinlichkeitsverteilung mit $n = 200$ und $p = 0,02$

$$P(3 \leq X \leq 5) = P(X \leq 5) - P(X \leq 2) = 0,7867 - 0,2351 = 0,5516 = 55,16 \%$$

Berechnung mit CAS:
als Differenz



oder direkt



Ergebnis: Mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 55 % enthält die Stichprobe 3, 4 oder 5 defekte Zündkerzen.

Problemstellungen bei bekannter kumulierter Wahrscheinlichkeit

Bisher war stets n , p und k bekannt.

Gesucht war die kumulierte Wahrscheinlichkeit $P(X \leq k)$.

Neue Problemstellungen

- Bekannt sind n , p und $P(X \leq k)$. Gesucht ist k .

Beispiel 1

- ➔ Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Pumpflasche Ausschuss ist, liegt bei 4 %. Es werden 2300 Pumpflaschen überprüft. Die Wahrscheinlichkeit, dass höchstens k Pumpflaschen Ausschuss sind, beträgt 1 %. Bestimmen Sie die Anzahl k .

Lösung

Die Zufallsvariable X gibt die Anzahl der defekten Pumpflaschen an.

X ist $B_{2300;0,04}$ -verteilt.

Bedingung für k : $P(X \leq k) = 0,01$

Berechnung von k mit CAS:

x	f(x):=binomCdf(2300,0.04,x)
68.	0.004685
69.	0.006538
70.	0.008998
71.	0.012217
72.	0.01637

Ergebnis: Die Wahrscheinlichkeit, dass höchstens 70 Pumpflaschen Ausschuss sind, ist 1 %.

- Bekannt sind p , k und $P(X \leq k)$. Gesucht ist n .

Beispiel 2

- ➔ Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schraube fehlerhaft ist, liegt bei 2 %. Die Schrauben werden in Kartons gefüllt und verkauft. Der Hersteller garantiert, dass in einer Schachtel höchstens 5 fehlerhafte Schrauben sind mit einer Wahrscheinlichkeit von 98,5 %. Bestimmen Sie die Anzahl der Schrauben in einer Schachtel.

Lösung

Die Zufallsvariable X gibt die Anzahl der fehlerhaften Schrauben an.

X ist $B_{n;0,02}$ -verteilt.

Bedingung für n : $P(X \leq 5) = 0,985$

Berechnung von n mit CAS:

x	f(x):=binomCdf(x,0.02,5)
98.	0.985866
99.	0.985202
100.	0.984516
101.	0.983809
102.	0.983081

Ergebnis: In einen Karton sollten 100 Schrauben gefüllt werden.

4.1 Bestimmung von Konfidenzintervallen

In der Realität hat man häufig keine Informationen über die Wahrscheinlichkeit p einer Grundgesamtheit. Dies soll am folgenden Beispiel verdeutlicht werden:

Eine Urne enthält viele weiße und schwarze Kugeln. Die Wahrscheinlichkeit für das Ziehen einer weißen Kugel ist nicht bekannt. In diesem Fall kann man wiederholt eine weiße Kugel mit Zurücklegen ziehen (Stichprobenumfang n) und die relative Häufigkeit h für das Ereignis „weiße Kugel“ berechnen. Die relative Häufigkeit ist ein **Schätzwert** für die unbekannte Wahrscheinlichkeit. Bei einem solchen Schätzwert weiß man nicht, wie gut diese Schätzung ist. Man versucht jedoch ein bestimmtes Intervall anzugeben, in dem p mit hoher Wahrscheinlichkeit (Sicherheitswahrscheinlichkeit) liegt.

Die Sicherheitswahrscheinlichkeit heißt auch Konfidenzniveau oder Vertrauensniveau. Das zugehörige Intervall heißt **Konfidenzintervall oder Vertrauensintervall**.

Das Konfidenzintervall einer Variablen zur Sicherheitswahrscheinlichkeit 95 % ist der Bereich, in den die Variable mit 95 %-iger Wahrscheinlichkeit fallen wird. Man geht von einer repräsentativen Stichprobe aus und schließt auf die (unbekannte) Grundgesamtheit.

Beispiel 1

- ➡ Vor der Bürgermeisterwahl werden 500 Bürger befragt, ob sie Kandidat A wählen wollen. 275 Wahlberechtigte bejahen diese Frage. Verwenden Sie die Sicherheitswahrscheinlichkeit 95 %.
- Entscheiden Sie, ob der Kandidat A mit der Mehrheit der Stimmen rechnen kann.
 - Prüfen Sie, ob die p -Werte 0,51 und 0,49 mit dem Stichprobenergebnis von 275 verträglich sind.
 - Bestimmen Sie das Intervall aller p -Werte, in deren 95 %-Umgebung das Stichprobenergebnis von 275 liegt.

Lösung

- a) Stichprobenumfang $n = 500$
relative Häufigkeit als **Schätzwert** für die unbekannte Wahrscheinlichkeit: $h = \frac{275}{500}$

Binomialverteilung mit $n = 500$ und $p = \frac{275}{500} = 0,55$

Erwartungswert: $\mu = 275$ Standardabweichung: $\sigma = 11,12$

Berechnung der 95 %-Umgebung des Erwartungswertes:

$$\left[0,55 - 1,96 \cdot \frac{11,12}{500}; 0,55 + 1,96 \cdot \frac{11,12}{500} \right] = [0,506; 0,594]$$

ganzzahlige Grenzen: 254 und 296

Geht man von einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 0,55 aus, dann wird Kandidat A mit einer Sicherheitswahrscheinlichkeit von 95 % von 50,6 % bis 59,4 %, entsprechend 254 bis 296 Wahlberechtigten gewählt.

Er kann also mit 95 %-iger Wahrscheinlichkeit mit einer Mehrheit rechnen.

Es bleibt ein Unsicherheitsfaktor von 5 %.

Man sagt: $p = 0,55$ ist **verträglich** mit dem Stichprobenergebnis von 275.

b) **95 % Umgebung zu $p = 0,51$**

Binomialverteilung mit $n = 500$ und $p = 0,51$:

Erwartungswert: $\mu = 255$


Standardabweichung: $\sigma = 11,18$

95 %-Umgebung von μ : $[255 - 1,96 \cdot 11,18; 255 + 1,96 \cdot 11,18] = [233,09; 276,91]$

ganzzahlige Grenzen: 234 und 276

Das Stichprobenergebnis von 275 liegt in der 95 %-Umgebung von $\mu = 255$.

Man sagt: $p = 0,51$ ist **verträglich** mit dem Stichprobenergebnis von 275.

**95 % Umgebung zu $p = 0,49$**

Binomialverteilung mit $n = 500$ und $p = 0,49$:

Erwartungswert: $\mu = 245$


Standardabweichung: $\sigma = 11,18$

95 %-Umgebung von μ : $[245 - 1,96 \cdot 11,18; 245 + 1,96 \cdot 11,18] = [223,09; 266,91]$

ganzzahlige Grenzen: 224 und 266

Das Stichprobenergebnis von 275 liegt nicht in der 95 %-Umgebung von $\mu = 245$.

Man sagt: $p = 0,49$ ist nicht **verträglich** mit dem Stichprobenergebnis von 275.



c) Lösung mithilfe der 1,96 σ -Regel

Eine 95%-Umgebung entspricht näherungsweise der 1,96 σ -Umgebung von μ :

$$\mu - 1,96\sigma \leq X \leq \mu + 1,96\sigma$$

Mit $\mu = 500p$ und $\sigma = \sqrt{500p(1-p)}$ und $X = 275$ ergibt sich

$$500p - 1,96\sqrt{500p(1-p)} \leq 275 \leq 500p + 1,96\sqrt{500p(1-p)}$$

Division durch den Stichprobenumfang 500:

$$\text{Mit } h = \frac{275}{500} = 0,55 \quad p - 1,96\sqrt{\frac{p(1-p)}{500}} \leq 0,55 \leq p + 1,96\sqrt{\frac{p(1-p)}{500}}$$

Lösung mit Hilfe der **Konfidenzellipse**

$$H_1 \text{ mit } H_1(p) = p + 1,96\sqrt{\frac{p(1-p)}{500}}$$

$$H_2 \text{ mit } H_2(p) = p - 1,96\sqrt{\frac{p(1-p)}{500}}$$

$$H_3 \text{ mit } H_3(p) = 0,55$$

Die Graphen von H_1 mit H_3 schneiden sich in $p_1 \approx 0,5064$.


Die Graphen von H_2 mit H_3 schneiden sich in $p_2 \approx 0,5936$.

Konfidenzintervall (Vertrauensintervall):

$$VI = [p_1; p_2] = [0,5064; 0,5936]$$

Alle Wahrscheinlichkeiten zwischen 0,5064 und 0,5936 sind mit dem Stichprobenergebnis von 275 **verträglich** bei einer Sicherheitswahrscheinlichkeit (Vertrauensniveau) von 95%.

Hinweis: Wählen Sie die Window-Einstellung auf beiden Achsen von 0 bis 1.




Bemerkung zur repräsentativen Stichprobe

Um mithilfe einer Stichprobe gültige Aussagen über die Grundgesamtheit (z. B. eine Population) treffen zu können, muss die Stichprobe **repräsentativ** sein, d. h., ihre Zusammensetzung entspricht der Zusammensetzung der Grundgesamtheit, aus der sie stammt. Sie ist ein verkleinertes Abbild der Grundgesamtheit.

Die Verteilung eines Merkmals innerhalb der Stichprobe und in der Grundgesamtheit sollten gleich sein. Die Repräsentativität einer Stichprobe hängt weniger von ihrer Größe als vielmehr vom Auswahlverfahren ab.

Ein **Konfidenzintervall (Vertrauensintervall)** ist ein Schätzintervall, welches die unbekanntere Wahrscheinlichkeit p mit einer Sicherheitswahrscheinlichkeit γ enthält (Schluss von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit, die relative Häufigkeit ist bekannt).

Hinweis: Das Vertrauensintervall $VI = [p_1; p_2]$ überdeckt mit der Sicherheitswahrscheinlichkeit γ die wahre Wahrscheinlichkeit p .



Konfidenzintervall mit Konfidenzellipse bzw. Konfidenzparabel



Beispiel 2

➔ Aus einer Urne mit roten und schwarzen Kugeln wird eine Kugel mit Zurücklegen gezogen. Bei 250 Ziehungen erhält man 83 rote Kugeln. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten, eine rote Kugel zu ziehen, bei einer Sicherheitswahrscheinlichkeit von 90 %.

Lösung

Zufallsvariable X: Anzahl der rote Kugeln, X ist binomialverteilt.

Stichprobenumfang: $n = 250$; relative Häufigkeit: $h = \frac{X}{n} = \frac{83}{250} \approx 0,33$

Sicherheitswahrscheinlichkeit $\gamma = 0,90$ und damit $c = 1,64$

Damit p mit der ermittelten relativen Häufigkeit verträglich ist,

gilt:

$$p - 1,64\sqrt{\frac{p(1-p)}{250}} \leq h \leq p + 1,64\sqrt{\frac{p(1-p)}{250}}$$


Konfidenzellipse

$$H_1 \text{ mit } H_1(p) = p + 1,64\sqrt{\frac{p(1-p)}{250}}$$

$$H_2 \text{ mit } H_2(p) = p - 1,64\sqrt{\frac{p(1-p)}{250}}$$

$$H_3 \text{ mit } H_3(p) = 0,33$$

Die Graphen von H_1 und H_3 schneiden sich in $p_1 \approx 0,2833$. Die Graphen von H_2 und H_3 schneiden sich in $p_2 \approx 0,3804$.



Vertrauensintervall: $VI = [p_1; p_2] = [0,2833; 0,3804]$

Alternative:

Exakte Bestimmung von p aus der Ungleichung:

$$p - 1,64\sqrt{\frac{p(1-p)}{250}} \leq h \leq p + 1,64\sqrt{\frac{p(1-p)}{250}}$$

$$-1,64\sqrt{\frac{p(1-p)}{250}} \leq h - p \leq 1,64\sqrt{\frac{p(1-p)}{250}}$$

Quadrieren beider Seiten:

$$(h - p)^2 \leq 1,64^2 \cdot \frac{p(1-p)}{250}$$

Mit $h = 0,33$ ergibt sich:

$$250 \cdot (0,33 - p)^2 \leq 1,64^2 \cdot p(1-p)$$

$$250 \cdot (0,33 - p)^2 - 1,64^2 \cdot p(1-p) \leq 0$$

Hinweis: Die quadratische Ungleichung $250 \cdot (0,33 - p)^2 - 1,64^2 \cdot p(1-p) \leq 0$ kann durch Lösung der Gleichung $250 \cdot (0,33 - p)^2 - 1,64^2 \cdot p(1-p) = 0$ gelöst werden.

Konfidenzparabel


f mit $f(p) = 250(0,33 - p)^2 - 1,64^2 \cdot p(1-p)$

Schnittstellen des Graphen von f mit der p -Achse:

$$p_1 \approx 0,2833; p_2 \approx 0,3804$$

Vertrauensintervall $VI = [0,2833; 0,3804]$

Auf VI verläuft der Graph von f **nicht oberhalb** der p -Achse.



Konfidenzintervall näherungsweise mit Formel

Beispiel 3

- ➔ Vor der Kommunalwahl gibt es eine Umfrage von 1000 Wählern. Davon würden 370 Wähler dem Kommunalpolitiker Abt ihre Stimme geben. Bestimmen Sie das 95%-Konfidenzintervall für den unbekanntem Anteil p der Wähler des Kandidaten Abt näherungsweise.



mvurl.de/3ddz

Lösung

Zufallsvariable X : Anzahl der Wähler des Kommunalpolitikers Abt; X ist binomialverteilt. Stichprobenumfang: $n = 1000$; relative Häufigkeit: $h = \frac{370}{1000} = 0,37$

Sicherheitswahrscheinlichkeit: $\gamma = 0,95$ und damit $c = 1,96$

Näherungsweise Bestimmung: Damit p mit der ermittelten relativen Häufigkeit verträglich ist,

$$\text{gilt: } p - 1,96\sqrt{\frac{p(1-p)}{250}} \leq h \leq p + 1,96\sqrt{\frac{p(1-p)}{250}}$$

$$\text{Wegen } h \approx p: \quad h - 1,96\sqrt{\frac{h(1-h)}{250}} \leq p \leq h + 1,96\sqrt{\frac{h(1-h)}{250}}$$

$$p \text{ liegt zwischen den Grenzen } h - 1,96\sqrt{\frac{h(1-h)}{250}} \text{ und } h + 1,96\sqrt{\frac{h(1-h)}{250}}.$$

$$\text{Einsetzen von } h = 0,37 \text{ ergibt } VI = \left[0,37 - 1,96\sqrt{\frac{0,37(1-0,37)}{1000}}; 0,37 + 1,96\sqrt{\frac{0,37(1-0,37)}{1000}} \right]$$

Konfidenzintervall näherungsweise: $[0,3401; 0,3999]$

Zwischen 34% und 40 % der Wähler werden Abt mit einer Sicherheitswahrscheinlichkeit von 95 % wählen.

Konfidenzintervall näherungsweise mit CAS

Beispiel 4

- ➔ Zwei Monate vor der Landtagswahl wurde die „Sonntagsfrage“ gestellt: „Welche Partei würden Sie wählen, wenn am Sonntag Wahl wäre?“

Die Umfrage wurde mit 1250 repräsentativ ausgewählten Wahlberechtigten durchgeführt. Hierbei haben sich 42 % für die Partei A entschieden.

Berechnen Sie bezogen auf diese Stichprobe mithilfe des 95 %-Konfidenzintervalls die Mindest- und Höchstanzahl aller Wahlberechtigten (460 000), die Partei A am Sonntag nach der Umfrage gewählt hätten.

Lösung

Konfidenzintervall für p :

Eingabe in CAS: $n = 1250$; $k = 1250 \cdot 0,42 = 525$; $\gamma = 0,95$

Konfidenzintervall: $VI = [0,3926; 0,4474]$

Anzahl der Wähler von A:

$$0,3926 \cdot 460\,000 = 180596;$$

$$0,4474 \cdot 460\,000 = 205804$$

Die Stichprobe lässt mit einer Sicherheit von 95 % auf mindestens 180596 und höchstens 205804 Wahlberechtigte schließen, die Partei A wählen.

zInterval 1Prop 525,1250,0.95: stat.results	
"Titel"	"1-Prop z-Intervall"
"CLower"	0.392639
"CUpper"	0.447361
"p"	0.42
"ME"	0.027361
"n"	1250.

Was man wissen sollte ... über Konfidenzintervalle

Bestimmung von p aus der Ungleichung: $p - c\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq h \leq p + c\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$

Stichprobenumfang n; Vertrauenszahl c; relative Häufigkeit h


• **Bestimmung mit Konfidenzellipse**

H₁ mit $H_1(p) = p + c\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$

H₂ mit $H_2(p) = p - c\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$

H₃ mit $H_3(p) = h$

Konfidenzintervall: VI = [p₁; p₂]



• **Bestimmung mit Konfidenzparabel**

Quadrieren der Ungleichung

$$-c\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq h - p \leq c\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$


ergibt:

$$n \cdot (h - p)^2 - c^2 \cdot p(1 - p) \leq 0$$

Grafische Darstellung

f mit $f(p) = n \cdot (h - p)^2 - c^2 \cdot p(1 - p)$

VI ist der Bereich mit $f(p) \leq 0$



• **Bestimmung näherungsweise mit Formel**

Wegen $p \approx h$ gilt:

$$h - c \cdot \sqrt{\frac{h(1-h)}{n}} \leq p \leq h + c \cdot \sqrt{\frac{h(1-h)}{n}}$$

Konfidenzintervall:

$$VI = \left[h - c\sqrt{\frac{h(1-h)}{n}} ; h + c\sqrt{\frac{h(1-h)}{n}} \right]$$

Bedingungen für die Anwendung der Näherungsformel

$n \geq 1000$


$0,3 \leq h \leq 0,7$

$\sigma > 3$

Hinweis: Je größer der Stichprobenumfang ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sich die Anteile in der Stichprobe und in der Grundgesamtheit stark unterscheiden.

• **Bestimmung näherungsweise mit CAS (Tests, 1-PropZInt)**

Eingabe von Stichprobenumfang n, Anzahl der Treffer k, Sicherheitswahrscheinlichkeit γ



5 Prüfungsvorbereitung - Lineare Algebra

• Ohne Hilfsmittel

1 In einem mehrstufigen Prozess ergeben sich folgende Zusammenhänge: $C_{RE} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$.

Die Produktion der Endprodukte erfolgt mit $\vec{m} = \begin{pmatrix} x \\ 2x \\ 3x \end{pmatrix}$.

Im Lager befinden sich noch die folgenden Rohstoffe: $\vec{r} = \begin{pmatrix} 20 \\ 19 \\ 19 \end{pmatrix}$.

Die Rohstoffpreise pro Mengeneinheit werden durch den Vektor $k_R^T = (2 \ 3 \ 2)$ angegeben.

1.1 Bestimmen Sie die Anzahl der Endprodukte, die durch den vollständigen Verbrauch der Rohstoffe hergestellt werden können.

1.2 Berechnen Sie die Rohstoffkosten für die Produktion von 3 ME E_1 , 2 ME von E_2 und 1 ME von E_3 .

2 Drei Betriebe B_1 , B_2 und B_3 sind nach dem LEONTIEF-Modell miteinander vernetzt. Die gegenseitige Belieferung und die Abgabe an den Markt betragen in ME:

	B_1	B_2	B_3	Konsum	Produktion
B_1	a	10	20	20	100
B_2	20	b	20	10	80
B_3	20	20	c	0	80

Bestimmen Sie die fehlenden Werte und berechnen Sie die Inputmatrix.

In der nächsten Periode sollen folgende Mengen produziert werden:

B_1 150 ME, B_2 100 ME und B_3 110 ME. Berechnen Sie den zugehörigen Konsumvektor.

3 In einem System verteilt sich der Gesamtbestand auf die Zustände A und B. Zum Zeitpunkt n mit $n \in \mathbb{N}$ wird die Verteilung auf die Zustände A und B durch den Vektor $\vec{v}_n^T = (a_n \ b_n)$ beschrieben. Dabei gibt a_n denjenigen Anteil des Gesamtbestands an, der sich im Zustand A befindet, und b_n denjenigen Anteil des Gesamtbestands, der sich im Zustand B befindet.

Die Tabelle beschreibt die Übergänge zwischen den Zuständen von einem Zeitpunkt zum nächsten.

	nach	A	B
von			
A		0,7	0,3
B		0	1

Mithilfe der zugehörigen Übergangsmatrix M kann die Entwicklung der Zustandsverteilung durch $\vec{v}_n^T \cdot M = \vec{v}_{n+1}^T$ beschrieben werden.

3.1 Erstellen Sie das zugehörige Übergangendiagramm.

3.2 Für $\vec{v}_0^T = (a_0 \ b_0)$ gilt $0 < a_0 < 1$ und $0 < b_0 < 1$. Begründen Sie, dass mit zunehmendem Wert von n eine Koordinate des Vektors \vec{v}_n^T kleiner wird, während die andere größer wird.

3.3 Geben Sie eine Zustandsverteilung \vec{v}^T an, für die $\vec{v}^T \cdot M = \vec{v}^T$ gilt.

• **Mit Hilfsmittel (CAS)**

- 1 Ein namhaftes Teeunternehmen stellt aus drei unterschiedlichen Rohstoffen R_1 , R_2 und R_3 vier unterschiedliche Zwischenprodukte Z_1 , Z_2 , Z_3 und Z_4 her. Durch die Endproduktion entstehen daraus drei Teesorten E_1 , E_2 und E_3 .

Die Produktionsmatrizen mit $a, b, c \in \mathbb{N}$ lauten:

$$A_{RZ} = \begin{pmatrix} 12 & 7 & 5 & 1 \\ 3 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & a & b & 5 \end{pmatrix}; B_{ZE} = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 3 & 2 & 3 \\ 5 & 1 & 7 \\ 7 & c & 4 \end{pmatrix}; C_{RE} = \begin{pmatrix} 65 & 108 & 120 \\ 31 & 38 & 39 \\ 90 & 47 & 97 \end{pmatrix}$$

Das Teeunternehmen erhält einen Auftrag zur Lieferung von 460 Mengeneinheiten [ME] der Teesorte E_1 , 680 ME von E_2 und 840 ME von E_3 .

- 1.1 Bestimmen Sie algebraisch die Parameter $a, b, c \in \mathbb{N}$ der Produktionsmatrizen. Erstellen Sie das Verflechtungsdiagramm, das zu diesem Produktionsprozess gehört. Berechnen Sie, wie viele ME der Rohstoffe für diesen Auftrag erforderlich sind.
- 1.2 Die Rezepturen der Teesorten E_1 , E_2 und E_3 haben sich wie folgt geändert:

$$A_{RZ, \text{neu}} = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 5 & 1 \\ 2 & 5 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 7 & 5 \end{pmatrix}; B_{ZE, \text{neu}} = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 3 & 2 & 3 \\ 5 & 1 & 7 \\ 7 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

Im Rohstofflager befinden sich Rohstoffmengen in Höhe von 75400 ME von R_1 , 56000 ME von R_2 und 99800 ME von R_3 .

Es liegt folgender Kundenauftrag vor: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 500 \\ 300 \\ 400 \end{pmatrix}$.

Untersuchen Sie, welche Rohstoffmengen nachgekauft werden müssen, damit der Kundenauftrag ausgeführt werden kann.

Die Preise in Geldeinheiten pro Mengeneinheit [GE/ME] für die vorhandenen Rohstoffe sind durch den Vektor $\vec{k}_R^T = (0,25 \quad 0,4 \quad 0,5)$ gegeben. Die Preise in GE/ME für nachzukaufende Rohstoffe ergeben sich aus $\vec{k}_{R, \text{neu}}^T = (0,3 \quad 0,6 \quad 0,6)$

Die Kosten in GE/ME für die erste bzw. zweite Produktionsstufe sind durch die nachfolgenden Vektoren gegeben: $\vec{k}_Z^T = (1 \quad 4 \quad 3 \quad 7)$ und $\vec{k}_E^T = (12 \quad 8 \quad 15)$.

Die Fixkosten betragen 530 GE.

Die Erlöse pro Teesorte liegen bei 150 GE/ME für E_1 , 220 GE/ME für E_2 und 120 GE/ME für E_3 . Berechnen Sie für den Kundenauftrag den Gewinn.

- 2 Die drei Zweigwerke (Werk Z_1 , Z_2 und Z_3) der Zürli-Kohlin GmbH sind nach dem Leontief-Modell miteinander verflochten. Gegeben ist die folgende Input-Matrix:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0,25 & 0,35 & 0,2 \\ 0 & 0,6 & 0,2 \end{pmatrix}$$

Die gegenseitigen Lieferungen sowie die Gesamtproduktionsmengen und die Konsumabgaben sind im Folgenden in Mengeneinheiten (ME) angegeben.

- 2.1 Berechnen Sie die Leontief-Inverse $(E - A)^{-1}$ und zeigen Sie die

Übereinstimmung mit: $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0,75 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

- 2.2 Stellen Sie zum Konsumvektor $\vec{y} = \begin{pmatrix} 8 \\ 20 \\ 25 \end{pmatrix}$ die vollständige Input-Output-Tabelle auf.

- 2.3 Es ist geplant, dass die Werke Z_1 und Z_3 gleich viele Mengeneinheiten produzieren. Für den Konsum der Produkte von Werk Z_3 (in Mengeneinheiten) soll dann das Fünffache des Konsums der Produkte von Werk Z_1 (in ME) zur Verfügung stehen. Werk Z_2 stellt 30 Mengeneinheiten für den Konsum zur Verfügung. Beurteilen Sie, ob diese Vorgaben realisierbar sind, indem Sie hierzu den Produktions- und den Konsumvektor ermitteln.

- 2.4 Für die kommende Periode ist eine Produktion gemäß des Produktionsvektors

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 20a \\ a^2 \\ a^2 \end{pmatrix} \text{ mit } a \in \mathbb{R}, a > 0, \text{ geplant.}$$

- 2.4.1 Ermitteln und begründen Sie, für welche Werte von a sich ein realisierbarer Konsumvektor ergibt.

- 2.4.2 Für die von den Werken Z_1 , Z_2 und Z_3 an den Markt abgegebenen Güter wird jeweils ein Preis von einer Geldeinheit pro Mengeneinheit verlangt. Zeigen Sie, dass für $a = 20$ die Einnahmen maximal sind und geben Sie den zugehörigen Konsumvektor an.

3 Der Markt für Anti-Schuppen-Shampoo wird von wenigen Herstellern beherrscht. Zwei konkurrierende Unternehmen Denkel und Brogta starten gleichzeitig aufwändige Werbeaktionen für ihr Produkt. Eine parallel dazu verlaufende Marktanalyse ergibt folgendes Kundenverhalten: 45 % der Denkel-Kunden halten dem Unternehmen die Treue, 25 % wechseln zu Brogta und 30 % kaufen ein Shampoo von anderen Herstellern; 20 % der Brogta-Kunden wechseln zu Denkel, genauso viele zu einem anderen Hersteller und der Rest sind Stammkunden von Brogta; 40 % der Kunden anderer Hersteller verbleiben bei diesen, 30 % wechseln zu Brogta und der Rest zu Denkel. Die Marktuntersuchung liefert für den Monat März folgende Marktanteile: Denkel: 25 %, Brogta: 30 %, andere Hersteller: 45 %

3.1 Stellen Sie das Käuferverhalten grafisch in einem Übergangsdigramm und als Übergangsmatrix dar.

Die Werbeaktionen sollen über drei Monate durchgeführt werden. Berechnen Sie unter Berücksichtigung der Anfangsverteilung die Marktanteile nach den Werbeaktionen unter der Voraussetzung, dass die Kundenwanderung monatlich erfasst wird.

Beurteilen Sie den Erfolg der Werbemaßnahmen.

Sollte sich am Verbraucherverhalten nichts ändern, wird sich langfristig ein Gleichgewichtszustand ergeben. Ermitteln Sie den Fixvektor.

3.2 Durch weitere Marketingstrategien erzielen die Unternehmen Denkel und Brogta eine deutlich höhere Kundenbindung, so dass sich das Übergangsverhalten jetzt folgendermaßen darstellt:

von \ nach	Denkel	Brogta	Andere
Denkel	0,9	0	0,1
Brogta	0	0,8	0,2
Andere	0	0,5	0,5

Mehrere Monate nach Beginn der Marketingstrategien haben sich im Januar die Marktanteile $\vec{v}_{neu}^T = (0,3051 \quad 0,4068 \quad 0,2881)$ ergeben.

Ermitteln Sie die Marktanteile im Vormonat Dezember.

Untersuchen Sie die zukünftige langfristige Verteilung der Marktanteile.

Beurteilen Sie diese langfristige Entwicklung der Marktanteile unter Berücksichtigung der neuen Käuferwanderungen.